

نيوجين ٢٠٠ اس سي

NEOGEN 200 SC

الرسم العام للمبيد

كلورانترانيليبول ٢٠٪ و/ح Chlorantraniliprole 20% W/W

1 L

مبيد حشري على هيئة مركز معلق (SC)
Insecticide, Suspension Concentrate

التر



يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

رج العبوة قبل الاستخدام
Shake bottle before use

المادة الفعالة: كلورانترانيليبول 20% وزن / حجم

المواد الغير فعالة: (حاملة ومكملة) 80 % وزن / حجم

المجموع: 100 %

التركيب

الرسامات الأولية

- في حالة الاستنشاق: لا يوجد أخطار تتطلب إسمافات أولية خاصة، ولكن يمكن مراجعة الطبيب في حال التعرض الطويل للاستنشاق.
- في حال ملامسة العين: لا يوجد أخطار تتطلب إسمافات أولية خاصة، ولكن تغسل العين بالماء جيدا وهي مفتوحة، ويمكن مراجعة الطبيب عند الحاجة.
- في حال ملامسة الجلد: لا يوجد ما يتطلب إجراء إسمافات أولية خاصة، بغسل الجلد بالماء، وكذلك بغسل الملابس الملوثة بالمبيد قبل ارتدائها مرة أخرى.
- في حال ابتلاع المبيد: لا يوجد أخطار تتطلب إجراء إسمافات أولية، ويمكن مراجعة الطبيب عند الضرورة.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموزعة لوزارة الصحة (937) .

تحذير
Caution

نيوجين ٢٠٠ اس سي

NEOGEN 200 SC

خواص المبيد

نيوجين 200 اس سي مبيد حشري على هيئة مركز معلق، يعمل بالملامسة وعن طريق المعدة، ذو فعالية عالية وتجذرات منخفضة لمكافحة مجموعة واسعة من الديدان التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة (Lepidoptera)، ذو فعالية على جميع الأطوار اليرقية، إضافة إلى فعاليته على البيوض.

معدلات وطرق الاستعمال

المحصول	الامدة	نسبة الاستعمال	فترة التحريم (يوم)
الخضروات: طماطم وخس وملفوف وملفوف وبطاطس وزهرة وخيار.	دودة ثمار الطماطم، ديدان الملفوف، الديدان القارضة، الدودة الخضراء، وديدان دربات البطاطس.	20-17 مل / 100 لتر ماء	1 يوم للخرشوات 14 يوم للبطاطس
المحاصيل الحقلية: برسيم ووردس وسورغم، ذرة.	مختلف أنواع ديدان الأوراق مثل دودة الحشد الخريفية، ودودة كيزان الذرة، والديدان القارضة.	20-17 مل / 100 لتر ماء	7 أيام
الأشجار المثمرة: التفاحيات واللوزيات.	دودة ثمار التفاحيات.	20-17 مل / 100 لتر ماء	14 يوم
الموالج	الديدان القارضة و ديدان الثمار.	30-20 مل / 100 لتر ماء	
العنب	ديدان الثمار.	25-20 مل / 100 لتر ماء	3 أيام

ملاحظات

يستعمل المبيد وفقا لمعدلات الاستخدام المذكورة في هذا الملصق. يتم رصد تطور الافات واستخدام المبيد عند بلوغ العتبة الاقتصادية المحلية. يجب التقيد بتوصيات النشرة لا سيما فيما يتعلق بالنسب والفترات والتوقيت الأمثل للاستخدام وإعادة الرشوات الورقية على معظم المحاصيل عند الحاجة بموجب فترة 10 إلى 14 يوم. استعمال كمية وأمرة من مزيج محلول لتأمين الفطاء الكامل للارش. يجب عدم استعمال نيوجين 200 اس سي داخل مشاتل باستثناء مشاتل اشجار الفاكهة وبيوت اثمار النباتات او على نباتات مزروعة كاشتال صغيرة.

فترة إعادة الدخول للحقل

يمنع دخول المنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة ب 4 ساعات الا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين. ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي مثل منزر، خداء، قفعة، مقاراز، اقنعة قبل الدخول ولامسة الاجزاء المعاملة مثل النبات والتربة.

قابلية الخلط

قابل للخلط مع المبيدات الزراعية ويفضل إجراء اختبار الخلط قبل الاستخدام. عند الخلط تضاف النواع المختلفة كما هو مبين أدناه مع أتاحة الوقت الكافي لاستكمال الخلط بعد إضافة كل مبيد: كبس المياه القابلة للذوبان، حبيبات تذوب بالماء، مسحوق قابلة، مركبات معلقة أخرى، مبيدات قابلة للذوبان في الماء، مركبات زيتية معلقة، مركبات مستحلبة، المواد المساعدة والسطحية والزيوت، الاسمدة الذائبة، منظمات الانجراف.

التخزين

يحفظ المبيد في مكان جاف وفي عبواته الاصلية في مخزن محكم بعيدا عن المنازل ومصادر المياه والذخور ومحاصيل اللاف والطعمة.

الآثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان اذا ابتلع او استنشق او لمس العين او الجلد. سام للأسماك والاحياء المائية، ومتوسط السمية على نحل العسل والنحل الطنان الخاص بالتلقيح. ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد التسمم، ويكون العلاج حسب الاعراض الظاهرة.

اعراض التسمم

يمكن ان يحدث حساسية للعين، تجنب ملامسة العين.

الاحتياطات

- تجنب المدولة غير اللازمة بالمبيد.
- عند استعمال المبيد يجب ارتداء الملابس الواقية خفيفة الوزن طويلة الاكمام المناسبة لحماية النباتات، والاحذية الجاهدة مثل الاحذية المطاطية لجميع الأغراض، وقفازات واقية لوقاية النباتات.
- اغسل القفازات قبل نزعها، واتبع إرشادات الشركة المصنعة لمعدات الحماية الشخصية.
- بشكل عام يمكن دخول المناطق المعاملة بعد ان يجف سائل المبيد على الشتل.
- تجنب المدولة غير اللازمة بالمبيد.
- عند استعمال المبيد يجب ارتداء الملابس الواقية خفيفة الوزن طويلة الاكمام المناسبة لحماية النباتات، والاحذية الجاهدة مثل الاحذية المطاطية لجميع الأغراض، وقفازات واقية لوقاية النباتات.
- اغسل القفازات قبل نزعها، واتبع إرشادات الشركة المصنعة لمعدات الحماية الشخصية.
- بشكل عام يمكن دخول المناطق المعاملة بعد ان يجف سائل المبيد على الشتل.
- اغسل الملابس الملوثة جيدا بالماء والصابون.
- براعى استعمال المعدلات المنصوص عليها ببطاقة المبيد، ولا يفضل زيادة جرعة المبيد عن الحد المسموح.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع ميعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لاي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وأمراعها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الاصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج كحد أقصى ولا تتحمل الشركة مسؤولية اي ضرر ينتج عن سوء التطبيق او الاستخدام او التخزين.



www.sdelta.com.sa

تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
هاتف: 533 654 112 966 Tel+
فاكس: 532 654 112 966 Fax+

P-0000000087

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية