



ميتروزين ٧٠٠ ديلو بي

METROZIN 700 WP



يستخدم لمكافحة الأعشاب ريفية وعريضة الأوراق

مبيد عشبي جهازى اختياري يستخدم لمكافحة الأعشاب ريفية وعريضة الأوراق قبل وبعد الانبات على هيئة مسحوق قابل للبلل بالماء (WP)

1 kg

1 كغم

المادة الفعالة :
ميتريبوزين 70% وزن / وزن
Metribuzin 70% W/W

أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإرشادات الأولية

- عند الإبتلاع: عند الإبتلاع، يغسل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسه الجلد: نزع الملابس الملوثة بغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٢٧)

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية ولا يتقبل الخلط مع المبيدات المثببة المركبة العالية التركيز ، ينصح بعمل تجربة خلط على مساحة صغيرة قبل الخلط على مساحة كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعداً عن المواد الغذائية ، الأعلاف ، الأسمدة والبذور.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سالم للتلل والأسماك وشديد السمية على الإنسان والحيوانات الأليفة إذا ما تم ابتلاعه أو استنشاقه وسام للحيوانات المائية ويحظر عن إضافته على المسطحات المائية أو الأراضي شديدة الرطوبة خشية حدوث تلوث بالماء الأرضي الذي قد يستخدم للشرب وخطر على البيئة.

مضاد التسمم

لا توجد أعراض محددة. لا توجد جرعة معينة وتجري المعالجة حسب الأعراض الظاهرة.

أعراض التسمم

لا توجد أعراض محددة.

مضاد التسمم

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- تجنب الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفص ، قفازات واقية).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأفم والعين.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منها بآنا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم فتح نهايات العبوات الورقية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر نتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

www.sdelta.com.sa تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة	شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية Saudi Delta Company for Chemical Industries المملكة العربية السعودية ● Kingdom of Saudi Arabia تلفون ٥٣٣ ١٢٤ ٦٥٤ ٦٩٦ ● فاكس ٥٣٣ ١٢٤ ٦٥٤ ٦٩٦ ● رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية ٤٨-٣٩٦٠-١٢٣٠
---	--

خواص واستخدامات المبيد

- **ميتروزين ٧٠٠ ديلو بي:** مبيد عشبي جهازى اختياري يستعمل على البطماس قبل الإنبات ويعد ويستخدم على الطماطم المزروع بالشتل في الحقول المفتوحة فقط والبرسيم لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميجا (Poa annua) بالحصول على توزيع جيد للمبيد في منطقة الجذور يجب أن تكون التربة رطبة وأيضاً يجب أن تكون الطبقة السطحية للتربة محروقة جيداً.
- **طريقة تحضير محلول الرش:** املاً نصف وعاء الرش بالماء ثم ضع الكمية المطلوبة من المسحوق في مصفاة وعاء الرش ثم أضف الكمية الباقية من الماء إلى المصفاة حتى يذوب المسحوق وامزج جيداً.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول	الوقت	نوع التربة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
البطماس: يتم الرش مرة واحدة فقط خلال الموسم ، يجب ألا يزيد طول الأعشاب عند مكافحة عن ٢,٥ سم	قبل الإنبات	خفيفة	٠,٠٥ - ٠,٧٥ كجم/ هكتار	٦٠ يوم
		متوسطة ثقيلة	٠,٧٥ - ١ كجم/ هكتار	
البطماس	بعد إنبات البطماس وحتى ارتفاع البطماس ٥ سم وعند تخطي هذا الطول يحدث ضرر للنبات	خفيفة متوسطة ثقيلة	٠,٥ كجم/ هكتار	٦٠ يوم
الطماطم في الحقل	بعد حوالي عشرة أيام من غرس الشتلات	- - - -	٠,٥ كجم/ هكتار	٤٢ يوم
البرسيم	في السنة الثانية من عمر المحصول وخلال طور السكون يستعمل فقط على البرسيم المزروع وكلف وليس على البرسيم المزروع للبيذار	- - - -	٠,٥ - ٠,٧٥ كجم/ هكتار	٢٨ يوم

الأعشاب: الحشائش عريضة الأوراق وعشبة سميجا

ملاحظات

- معدلات الاستخدام الأدنى مخصصة للأراضي الخفيفة والمتوسطة والمعدلات الأعلى للأراضي الطينية.
- إن أفضل النتائج يمكن الحصول عليها عند استعمال المبيد على التربة المفككة ذات الرطوبة السطحية حتى عمق ٣ - ٥ سم.
- يجب ألا يزيد معدل الاستخدام على أصناف البطماس المبكرة ٠,٥ كجم/ هكتار.
- لا يستخدم هذا المبيد على التربة الرملية التي تحتوي على أقل من ١ ٪ مواد عضوية.
- قد تصاب البطماس بالضرر إذا تم الرش بعد تجاوز النبات ارتفاع ٥ سم.
- لا يرش هذا المبيد إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية. لا يسمح باستخدام هذا المبيد على الطماطم المزروعة في البيوت المحمية.
- لا يكافح هذا المبيد حشيشه الأفي (Gallium aprinne).

فترة إعادة الدخول للتلل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة ب ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ، ويجب ارتداء الملابس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفص ، قفازات ، أقتنه) قبل الدخول وملازمة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

تحذير CAUTION

